

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ МАЛОГО ТАЗА (КТ ОМТ)

КТ проводится только с контрастом.

Контраст назначает врач-рентгенолог (КТ).

Если планируется применение йодсодержащего контрастного препарата, то рекомендуется провести дополнительные тесты (анализ крови на креатинин), чтобы исключить наличие острой или хронической почечной и печеночной недостаточности.

Если ранее проводились такие обследования как ирригоскопия, пассаж бария по кишечнику, рентгеноскопия желудка, то необходимо будет выждать не менее 7 суток, прежде чем проводить КТ любой из областей тела с контрастным усилением.

Подготовка к исследованию

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Соблюдение диеты, направленной на снижение газообразования в кишечнике: за сутки перед исследованием исключить из рациона грубую клетчатку (капуста, другие овощи и фрукты), газированные напитки, черный хлеб, кисломолочные продукты.

- **Исследование проводится натощак.**

- Накануне исследования — пероральный прием контрастного препарата по схеме.

- **Пациенту необходимо накануне исследования:**

- в Самаре — обратиться в рентген-кабинет для получения контрастного вещества;

- в Перми — самостоятельно приобрести препарат в аптеке.

Далее выпить разбавленное контрастное вещество (1 ампула 20 мл 76% урографина, или 76% триомбраста, или 46% тразографа, или 50 мл. омнипак растворить в 1 л. кипяченой теплой воды) дробно в три приема: 0,35 л раствора контрастного препарата за 8 часов до начала исследования; 0,35 л. за 4 часа и 0,35 л за 2 часа до начала исследования.

- За час до начала обследования необходимо выпить 0,5 л чистой негазированной воды.

В течение 2 часов до начала исследования не мочиться.