

КТ-АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ

КТ проводится только с контрастом.

Контраст назначает врач-рентгенолог. Если планируется применение йодсодержащего контрастного препарата, то рекомендуется провести дополнительные тесты (анализ крови на креатинин), чтобы исключить наличие острой или хронической почечной и печеночной недостаточности.

Если ранее проводились такие обследования как ирригоскопия, пассаж бария по кишечнику, рентгеноскопия желудка, то необходимо будет выждать не менее 7 суток, прежде чем проводить КТ любой из областей тела с контрастным усилением.

Подготовка к исследованию

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- За сутки необходимо обильное питье, что позволяет легче перенести введенный контраст и быстрее его вывести из организма. За 3-4 часа до проведения исследования КТ-ангиографии прием любой жидкости и пищи прекращается.
- **ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ:** до и после внутрисосудистого введения контрастного средства следует потреблять адекватное количество жидкости. Особую важность это имеет для больных с множественной миеломой, сахарным диабетом, полиурией, гиперурикемией, а также для грудных детей, маленьких детей и пациентов в преклонном возрасте.