

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Органы малого таза у женщин: прямая кишка, мочевого пузырь, матка, шейка матки, яичники, маточные трубы, влагалище.
Органы малого таза у мужчин: прямая кишка, мочевого пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки.

Методы проведения исследования:

- ▶ **Трансабдоминальное (ВЗР/ДЕТ)** исследование проводится через переднюю брюшную стенку. Этот метод УЗИ используется для диагностики заболеваний органов женской половой системы или мужской мочеполовой системы, контроля над их лечением, определения срока беременности и оценки развития плода. Также врачи под контролем УЗИ проводят пунктирование тканей.
- ▶ **Трансвагинальное (женщины)** — при проведении УЗИ во влагалище вводится специальный датчик. Этот метод проведения УЗИ относится к наиболее информативным, так как датчик размещается в максимально возможной близости к исследуемым органам. Трансвагинальное УЗИ не делают девственницам.
- ▶ **Трансректальное (мужчины)** используется для уточнения нарушений и опухолей в простате или семенниках и чаще всего назначается пациентам мужского пола, если нет возможности провести абдоминальное УЗИ, или его результаты оказываются не точны.

Подготовка к исследованию

- ▶ Трансабдоминальное (мужчины и женщины). За 1 час до исследования пациенту необходимо выпить 1 000 мл (1 литр) негазированной жидкости.
- Дети:** Плановое исследование: натощак (прием пищи за 4 часа до исследования, жидкости за 2 часа до исследования). Не проводится после очистительной клизмы, ЭГДС и колоноскопии.
- ▶ Экстренное исследование: без ограничений; до ЭГДС, колоноскопии, рентгенологических исследований под наркозом.
- ▶ Трансвагинальное (женщины) УЗИ органов малого таза проводится с 5 по 7 дни цикла в плановом порядке или по назначению лечащего врача во вторую фазу цикла. За день до обследования исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия — пирожные, торты). Эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой. За 1 час до исследования пациенту необходимо выпить 500 мл (2 стакана) негазированной жидкости!
- ▶ Трансректальное (мужчины) исследование требует опорожненного кишечника, для чего следует применить клизму за несколько часов до исследования (лучше поставить с утра, за 2-3 часа до планового обследования небольшую, 200-300 мл, клизму из теплой воды). Исследование проводится с пустым мочевым пузырем, но в ряде случаев (исследование причин бесплодия, эрективных нарушений) перед исследованием нужно выпить около 4-х стаканов воды или иной несладкой и негазированной жидкости.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Скачайте бесплатное приложение «Альфа-Центр Здоровья» и записывайтесь на прием **в три клика**.

- ✓ Выберите нужного врача
 - ✓ Удобную дату
 - ✓ Подходящее время
- Готово! Вы записаны на прием.**

Не тратьте время на звонок в клинику!

Скачайте мобильное приложение «Альфа-Центр Здоровья» уже сегодня:

На iOS:



На Android:



На компьютере:

lk.alfazdrav.ru



ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.